


ขวัญชาติ ตันติกำajan : การประเมินคุณภาพชายหาดโดยใช้สัตว์น้ำดินขนาดใหญ่
บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างของประเทศไทย (BEACH QUALITY
ASSESSMENT USING BENTHIC MACROFAUNA ALONG THE SOUTHERN
ANDAMAN SEA COAST OF THAILAND) อาจารย์ที่ปรึกษา : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.ณัฐรุติ ฐานี, 227 หน้า:

การประเมินคุณภาพชายหาดโดยใช้สัตว์น้ำดินขนาดใหญ่บริเวณชายฝั่งทะเลอันดามันตอนล่างของประเทศไทย ดำเนินการในจังหวัดกรุงศรี ตรัง และสตูล พื้นที่ 8 ชายหาด โดยมีสถานีศึกษาทั้งหมด 30 สถานี ทำการตรวจคุณภาพน้ำ 8 ดัชนี คุณภาพดิน 4 ดัชนี และร้อยละของอนุภาคดิน 6 ขนาด ในช่วงฤดูร้อนตะวันตกเฉียงใต้ ฤดูร้อนตะวันออกเฉียงเหนือ และฤดูร้อนระหว่างเดือนกันยายน 2555 ถึงเดือนเมษายน 2556 พบว่าคุณภาพน้ำส่วนใหญ่ยังเริ่มเป็นกรด-เบสและออกซิเจนละลายน้อยในเกล้าท์มาตรฐานคุณภาพน้ำทะเลของประเทศไทย คุณภาพดินของชายหาดมีสภาพเป็นกลางถึงเป็นกรด โดยมีปริมาณอินทรีวัตถุและชาตุอาหารแตกต่างกันขนาดของอนุภาคดินมีความแตกต่างกันในแต่ละชายหาด โดยมีอัตราส่วนของขนาดที่พบมากถึงแต่รายละเอียดมากจนถึงขนาดกล่อง การเก็บตัวอย่างสัตว์น้ำดินขนาดใหญ่โดยใช้กรอบตารางสูงขนาดพื้นที่ 2.25 ตร.ม. ในเบตัน้ำเข้มน้ำลึก พบตัวอย่างสัตว์น้ำดินขนาดใหญ่ทั้งหมด 116 ชนิด จาก 51 วงศ์ 20 อันดับ 5 ชั้น และ 4 ไฟลัม กลุ่มที่พบจำนวนนิคมากที่สุดคือ โพลีคีต รองลงมาคือ มอลลัสก์ ครัสตาเชียน และบริชิโอพอด ความหนาแน่นโดยเฉลี่ย 23 – 935 ตัว/2.25 ตร.ม. โดยชนิดสัตว์พื้นฐาน 20 ชนิด ประกอบด้วย *Glycera alba*, *Goniadopsis incerta*, *Scoloplos (Scoloplos) tumidus*, *Prionospio (Prionospio) steenstrupi*, *Axiothella obockensis*, *Lumbrineris sp.* 2, *Scoletoma sp.* 3, *Glycera natalensis*, *Parapriionospio sp.*, *Mediomastus sp.*, *Dendronereis arborifera*, *Donax incarnatus*, *Donax faba*, *Umbonium vestiarium*, *Pitar sp.*, *Matuta victor*, *Dotilla intermedia*, *Diogenes dubius*, *Diogenes klassi* และ *Ocypode macrocera* การวิเคราะห์การจัดกลุ่มและความคล้ายคลึงของดัชนีทางนิเวศ และความคล้ายคลึงของความชุกชุมของสัตว์น้ำดินขนาดใหญ่พบว่า ดัชนีทางนิเวศของแต่ละสถานีมีความคล้ายคลึงกันสูงที่ร้อยละ 83 ในขณะที่ความชุกชุมของสัตว์น้ำดินขนาดใหญ่มีความคล้ายคลึงกันปานกลางที่ร้อยละ 21 จากการคำนวณหาดัชนีทางชีวภาพได้แก่ ดัชนีความหลากหลายนิพัทธ์ของมาร์กานเดฟ (D) ดัชนีความหลากหลายของแซนนอนวีเนอร์ (H) ดัชนีความเท่าเทียมกันของชนิดหรือความสม่ำเสมอ (J) และดัชนีความเด่นของชนิด (C) การวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและหาความสัมพันธ์ของดัชนีทางนิเวศและดัชนีทางชีวภาพโดยใช้สมการการทดสอบหมายตัวแปรพบว่าปริมาณฟอสฟेटและไนโตรตัน้ำ ความเค็ม ออกรูจีน

ถะถาย อุณหภูมิ ความชื้น ปริมาณฟอสเฟตและไนเตรตในดิน ความเป็นกรด-เบสของดิน และอนุภาคดินขนาด 0.71 มม. 0.3 มม. และ 0.075 มม. มีความสัมพันธ์กับดัชนีทางชีวภาพ ($p<0.05$) นอกจากนี้การประยุกต์ใช้โปรแกรม AMBI เพื่อประเมินคุณภาพชายหาดพบว่าชายหาดทั้งหมดอยู่ในสภาพธรรมชาติ (กลุ่ม 1) หรืออยู่ในสภาพถูกระบกวนเพียงเล็กน้อย (กลุ่ม 2)



สาขาวิชาชีววิทยา
ปีการศึกษา 2557

ถายมือชื่อนักศึกษา _____ 
 ถายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา _____ 
 ถายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม _____ 
 ถายมือชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาร่วม _____ 

KHWANTA TANTIKAMTON : BEACH QUALITY ASSESSMENT USING
BENTHIC MACROFAUNA ALONG THE SOUTHERN ANDAMAN SEA
COAST OF THAILAND. THESIS ADVISOR : ASST. PROF. NATHAWUT
THANEE, Ph.D. 227 PP.

BEACH QUALITY, BENTHIC MACROFAUNA, ANDAMAN SEA COAST,
ECOLOGICAL SENSITIVITY

The beach quality assessment using benthic macrofauna along the southern Andaman Sea coast of Thailand was conducted in Krabi, Trang and Satun provinces. The survey included 30 sampling stations of 8 beaches. Of these stations, 8 water variables, 4 sediment variables and 6 sediment particle size percentages were measured during the Southwest monsoon, the Northeast monsoon and the summer during September 2012 to April 2013. Most water variables did not exceed the Thailand Marine Water Quality Standard except pH and DO. The sediment qualities of sampling beaches were neutral to acidic with variation of nutrients and organic matter content. Sediment particle sizes also varied among the beaches with the main particle sizes ranged from very fine sand to medium sand. Benthic macrofauna were also collected by the quadrat sampling technique (2.25 m^2) at the intertidal zones.

Overall, 116 species were accounted belonging to 51 families, 20 orders, 5 classes of 4 phyla (Polychaeta, Mollusca, Arthropoda and Brachiopoda). The highest number of species was polychaetes followed by mollusks, crustaceans and brachiopods, respectively. The mean densities of benthic macrofauna were in the range of 23-935 individuals/ 2.25 m^2 . Common benthic macrofauna species consisted of 20 species

including *Glycera alba*, *Goniadopsis incerta*, *Scoloplos (Scoloplos) tumidus*, *Prionospio (Prionospio) steenstrupi*, *Axiothella obockensis*, *Lumbrineris* sp. 2, *Scoletoma* sp. 3, *Glycera natalensis*, *Parapriionospio* sp., *Mediomastus* sp., *Dendronereis arborifera*, *Donax incarnates*, *Donax faba*, *Umbonium vestiarium*, *Pitar* sp., *Matuta victor*, *Dotilla intermedia*, *Diogenes dubius*, *Diogenes klassi* and *Ocypode macrocera*. Cluster analysis and multidimensional scaling (MDS) were used to compare similarity of all sampling stations based on ecological variables and benthic macrofauna abundances. In the case of similarity based on ecological variable data, the results exhibited high similarity at 83% whereas moderate similarity at 21% was based on benthic macrofauna abundances. Four biological indices: Margalef richness index (D), Shannon-Wiener diversity index (H), Species equitability or Evenness index (J) and Species dominance index (C) were calculated. The major variables were investigated by Principal Component Analysis (PCA). The stepwise multiple linear regression was used to determine the correlation between the ecological variables and the biological indices. The phosphate and nitrate concentration in water, salinity, dissolved oxygen, temperature, turbidity, phosphate and nitrate concentration in sediment, sediment pH, sediment particle sizes 0.71 mm, 0.3 mm and 0.075 mm correlated to the biological indices ($p < 0.05$). Moreover, the AMBI software which was applied to interpret the beach health manifested that all sampling stations were defined into undisturbed (Group I) and slightly disturbed (Group II) beach status.

School of Biology

Student's Signature

Academic Year 2014

Advisor's Signature

Co-advisor's Signature

Co-advisor's Signature